LIJST *der door* C. Ritsema Cz. *op de algemeene Excursie van* 1 *Aug.* 1869 *op Molencate bij Hattem gevangen* Hymenoptera *en* Diptera.

Dolerus Eglanteriae, F. ♂.

Selandria (Eriocampa) adumbrata, Kl. ♀.

[1]) *Ichneumon tergenus, Grav. ♀.

* 〃 gracilicornis? Grav. ♀.

Lissonota impressor, Grav. ♀.

Ephialtes carbonator, Chr. ♀.

*Trioxys Heraclei, Hal. ♀. ♂. uit bladluizen van een der compositae.

Eulophus pectinicornis, Latr. ♀. ♂. uit een vlinderlarve.

Hedychrum lucidulum, F. ♀.

Formica rufa, L. ☿. zeer algemeen.

Mimesa unicolor, v. d. L. ♀.

Ammophila sabulosa, L. ♀ ♂ niet zeldzaam.

Pompilus pectinipes, v. d. L. ♂?

Cerceris variabilis, Schr. ♂.

Trypoxylon figulus, L. ♀.
〃 clavicerum, Lep ♀.
} beide soorten in menigte in de rietstengels der tuinhuisjes nestelende.

Crabro (Crossocerus) quadrimaculatus, Spin. Dhlb. ♀♀ type en var.

Odynerus constans, H. Sch. ♀.

Prosopis communis, Nyl. ♀.

Halictus laevigatus, Kirby ♂.

Andrena convexiuscula, Kirby. ♂?

Dasypoda hirtipes, Fabr. ♀ ♂, niet zeldzaam, meer grijs van kleur dan Holl. exemplaren.

Panurgus dentipes, Latr. enkele ♀♀.

*Saropoda rotundata, Pz. ♀♀ ♂♂.

---

[1]) De van een * voorziene soorten, waren tot dusverre nog niet als inlandsch ingeschreven, en zijn dus nieuw voor onze fauna.

Sargus cuprarius, L. ♀.
Dioctria Reinhardi, Wied. ♂.
1) Anthrax fenestrata, Fall. ♂.
Eristalis intricarius, L. ♀
Echinomyia tessellata, Fabr. ♂
Metopia leucocephala, Rossi ♀ ♂.
Anthomyia mitis, Meig. ♀.
2) Micropeza lateralis, Meig. ♀.
Oliviera lateralis, Fabr. ♁ ♂.

---

1) Volgens een schrijven van den heer van der Wulp, komt deze soort alleen in het oosten van ons land voor.

2) Deze vlieg is mede volgens den heer van der Wulp, nog al zeldzaam.